



RED PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AVES PLAYERAS

# Ficha de reconocimiento



## A vuelo de pájaro

Ficha quincenal de una guía para reconocer las aves de Chile.

### Zonas de nidificación

Vive entre Arica y Chiloé, aunque también se lo encuentra en menor cantidad hacia el sur, hasta el Estrecho de Magallanes.



Hace nidos en las dunas a pocos metros de la playa. Se trata de un pequeño hoyo en la arena donde pone de dos a tres huevos.

Lomo café oscuro y vientre blanco.



Sus ojos son amarillo intenso con un anillo periocular rojo, que contrasta con su cabeza negra.



Habita en playas arenosas, roqueríos, islotes cercanos al continente y dunas.

Su pico recto y fuerte lo usa para alimentarse de invertebrados, como ostras, almejas y cangrejos que busca bajo las rocas.

Nidifica entre octubre y diciembre



Generalmente anda en grupo o en pareja.

No hay diferencia de tamaño ni color entre el macho y la hembra.

## Pilpilén común

(*Haematopus palliatus*)

Largo: 43 a 44 cm



Descansa y nidifica en playas y dunas. Su principal amenaza son los vehículos motorizados que destruyen sus nidos y perros que depredan sus huevos y pichones. En otros países se lo conoce como "ostrero", por su preferencia por comer ostras.

Para reconocerlo, escuchar su canto y saber más, revise este código QR.



infografias.elmercurio.com



Categorías de conservación Internacional (IUCN): Preocupación menor | En Chile: No clasificada

Fuente Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), www.redobservadores.cl

EL MERCURIO

¡CONOZCAMOS, VALOREMOS Y PROTEJAMOS A LAS AVES PLAYERAS!



¡CONOZCAMOS, VALOREMOS Y  
PROTEJAMOS A LAS AVES PLAYERAS!



## Pilpilén común (*Haematopus palliatus*)



En Chile habita la subespecie *palliatus*, la cual se distribuye por el pacífico desde el Golfo de California en EEUU hasta el centro de nuestro país, mientras que por el Atlántico su distribución abarca desde Massachusetts, incluyendo islas del caribe, hasta el sur de Argentina.



Utiliza ambientes costeros, como estuarios fangosos, playas de arena y dunas, en donde nidifica a pocos metros de la playa, en una simple depresión en el suelo. Allí deposita entre 2-3 huevos de color piedra con pintas y manchas negras, los cuales se mimetizan con el entorno. El comienzo de la postura varía según la región geográfica, ya que se han reportado nidos activos entre agosto y enero en la región de Arica y Parinacota, entre octubre y febrero para la región de Valparaíso, y a partir de noviembre en la región de Los Lagos. En Magallanes, en tanto, se han reportado parejas con polluelos en noviembre.

### DÍAS DE DESARROLLO

